SR0540 十七烷基硫酸钠乳糖 TTC 琼脂配套试剂使用说明书

用 途:

用于添加至十七烷基硫酸钠乳糖 TTC 琼脂基础中。

成 份:

配套试剂 A:

 十七烷基硫酸钠
 0.01g

 无菌水
 1mL

配套试剂 B:

TTC 0.0025g 无菌水 0.5mL

使用方法:


1、西林瓶的打开方法:

本西林瓶在铝盖上有箭头的标志,开启西林瓶前,用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下,按铝盖上的箭头方向打开铝盖,撕开铝盖,打开西林瓶胶塞。如右图所示

2、试剂的使用方法:

取 1 支配套试剂 A 和 1 支配套试剂 B 添加于 100ml 已灭菌的冷却到约 50° C 十七烷基硫酸钠乳糖 TTC 琼脂基础中。在开盒后,未使用完请放回包装盒子内避光保存。

贮 存: 2~8℃规 格: 2×5 支/盒有 效 期: 见包装盒



地址:广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32079986

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877/8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com



(西林瓶开启示意图)